末梢動脈閉塞症 (PAD) のスクリーニングや IVR 中に血管造影で見つかった無症状の 50% 以上の狭窄病変を治療すべきかどうか、悩むことがあります。冠動脈に対する PCI の患者に骨盤・下肢血管造影を行い、見つかった PAD に対して片っ端からステントを留置している一部の医師の話も聞きます。基本的には症状が出現してから治療するというのが標準的なスタンスだと思いますが、中には重症化して再来院するケースもあります。今回はこのような無症状性 PAD に対する治療に関する最近の論文を紹介します。

Keeling AN, et al : Should Incidental Asymptomatic Angiographic Stenoses and Occlusions Be Treated in Patients with Peripheral Arterial Disease? J Vasc Interv Radiol 20 : 1133-1140, 2009.

はじめに

PAD の主な臨床症状は間歇性跛行であるが、無症状の例も多い。Hirsch によると、Ankle Brachial Index (ABI) で PAD をスクリーニングした 6417 例中、821 例 (11.8%) が新たに PAD と診断され、うち 342 例 (41.6%) は無症状であった。無症状の PAD の転帰は様々であり、リスクファクターによる影響が大きい、5 年間の F/U で 15.2% の例に間歇性跛行が生じると言われている。無症状性 PAD 病変の転帰は？ 無症状性病変は IVR を必要とするのか？ といった疑問点がある。

目的

1. 診断時での IVR の妥当性を評価するために、無症状性 PAD の臨床経過を明らかにする
2. 臨床的悪化に関わる因子を同定する
3. どのような病変は治療すべきかを明らかにする

対象と方法

1999 年から 2006 年までの 7 年半の間に下肢動脈造影あるいは PTA を施行した症候性の PAD 患者 918 例を対象に retrospective に検討。経過観察期間は 18 ヶ月から最長 9 年間。918 例中、122 (13.3%) 例で血管造影上、臨床症状を伴わない 50% 以上の狭窄あるいは閉塞がみられ、これらを無症状性 PAD と定義した。

これらの症例が経過中に間歇性跛行あるいは重症虚血へ移行した時、あるいは IVR や外科的血管再建術を行った場合を major adverse clinical outcome (MACO)

と定義し、その頻度と因子を検討した。

結果

平均 4.2 年間の経過観察で、122 例の無症状性 PAD 中、40 例 (32.8%) に症状が発現 (間歇性跛行 : 13.9%、重症虚血 : 18.9%) し、17 例 (42.5%) が血管再建術を必要とした。

17 例の内訳は IVR : 8 例、外科手術 : 8 例、PTA + 外科手術 : 1 例である。

MACO の独立予測因子は対側の below knee amputation (BKA) とスタチン服用であった。

その他の悪化因子として、末梢 run-off 動脈が 1 本以下、男性、70 歳以下、対側のバイパス術施行があげられる。

結論

無症状性 PAD のうち 1/3 が有症状となり、13.9% が血管再建を必要とした。対側の below knee amputation (BKA)、スタチン服用は臨床的悪化をもたらす独立した因子である。PAD 患者では慎重な経過観察と適切なリスクファクターの管理が大事である。

本論文は単一施設での retrospective な検討であり、症例数も決して多くない。しかし、無症状性 PAD の臨床的悪化の頻度、転帰、予後因子を明らかにした点で評価したい。

無症状性 PAD の病変部位として大腿膝窩部が 91% と大半を占めているが、これは日常診療でもよく経験することである。

無症状性 PAD のうち 1/3 が有症状となり、13.9% が血管再建を必要とした結果より、PAD 患者では健側も含めた経過観察が大事といえる。また有症状病変に対する PTA の施行により炎症が惹起されて、他の PAD 病変の進行を促した可能性も否定はできない。

対側の below knee amputation (BKA) 施行例は、PAD がより広範囲に進展しており、初期に健側が無症状性であっても、経過中慎重な経過観察が必要と言える。

スタチンにはプラークを安定化させ、動脈硬化の進行を抑制し、治療後の再発を予防する作用が報告されているにもかかわらず、本論文ではスタチン服用が悪化の予測因子となった点は奇異であるが、その理由として、スタチン服用群は元来、長期に亘る高脂血症が持続していた、スタチンの量が十分ではなく、服用しても高脂血症が 20% にみられた、服薬の遵守率が必ずしも高くはない等があげられている。

本論文の結果により、無症状性 PAD の 1/3 が臨床上的悪化を示すことを念頭におき、PTA 後は健側も含めた慎重な経過観察と、適切なリスクファクターの管理が重要であると言える。予防的 IVR の是非については、さらに多数例での検討が必要であろう。

<参考文献>

1. Hirsch AT, et al : Treatment of peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in primary care. JAMA 286 : 1317-1324, 2001.
2. Schillinger M, et al : Vascular inflammation and percutaneous transluminal angioplasty of the femoropopliteal artery : association with restenosis. Radiology 225 : 21-26, 2002.